

Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

1. Dosis pupuk NPK berpengaruh sangat nyata terhadap tinggi tanaman (50 dan 65 HST), berat berangkasan basah tanaman, berat basah polong per plot. Hasil terbaik diperoleh pada perlakuan P_3 (dosis NPK 600kg/ha).
2. Dosis pupuk bokashi berpengaruh sangat nyata terhadap tinggi tanaman (50 dan 65 HST), jumlah cabang (35 dan 65 HST), berat berangkasan basah tanaman, jumlah polong tanaman sampel dan berat basah polong per plot, berpengaruh nyata terhadap jumlah cabang pada umur 50 HST. Hasil terbaik diperoleh pada perlakuan B_3 (dosis bokashi 15ton/ha).
3. Interaksi antara dosis pupuk NPK dan dosis pupuk bokashi berpengaruh sangat nyata terhadap tinggi tanaman (50 dan 65 HST), berat berangkasan basah tanaman, dan berat basah polong per plot. Hasil terbaik diperoleh pada kombinasi perlakuan P_3B_3 (pengaruh dosis pupuk NPK 600kg/ha dan dosis pupuk bokashi 15ton/ha).

Saran

Untuk budidaya tanaman kacang tanah disarankan untuk menggunakan dosis pupuk NPK 600kg/ha dengan dosis pupuk bokashi 15ton/ha agar dapat meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman kacang tanah.